

Le Cuivré des marais



© Gaëlle Sobczyk-Moran

En route pour la préservation de ce
petit papillon rare !

Le **Cuivré des marais** (*Lycaena dispar*) est un papillon d'environ 4 cm d'envergure, qui affectionne les **prairies humides de fonds de vallée**, aux sols profonds et riches en nutriments, sur les **bords de cours d'eau**, les **fossés**, ou encore les **marais**.



© M. Poupin



© M. Poupin

Ce papillon vient pondre ses œufs sur les espèces d'**Oseille**, appelées **plantes hôtes**, et s'alimente sur des **plantes nourricières** telles que certaines espèces de **Salicaire**, **Pulicaire**, **Menthes** ou encore la **Reine-des-prés**.



Comment différencier mâle et femelle ?



© P. Le Poulain

Mâle

orange brillant, à
bordure noire, avec
une **tâche**
discoïdale noire

Femelle



© P. Le Poulain

orange à bordure noire
large et **points noirs**

brun-noir à **bande orange**




© T. Pieters

aile postérieure : couleur bleu argenté, 2 points
centraux très fins et accolés, formant une **virgule noire**

Sa répartition en Île-de-France

L'espèce n'est plus présente que dans la Vallée du Petit Morin et la Bassée (**deux sites Natura 2000**), en raison notamment de pratiques de gestion des prairies inadaptées (période, technique, usage de produits) **pendant la période de reproduction**, ou encore la disparition progressive des prairies humides.

Le CPIE, en tant qu'**animateur du site Natura 2000 de la Vallée du Petit Morin** (pour les milieux terrestres), suit désormais les populations de Cuivré des marais et accompagne les acteurs pour adapter leurs modes de gestion **en faveur de cette espèce**.



Le Cuivré des marais est une **espèce protégée** et la destruction d'individus ou de son habitat est interdite.

Autres papillons des prairies humides


Cuivré fuligineux (*Lycaena tityrus*)



mâle généralement **brun-noir**

taches foncées sur le dessus des ailes pour les deux sexes


frange blanche



dessous des ailes **pâle et taché de noir**

Autres papillons des prairies humides

Demi-Argus (*Cyaniris semiargus*)



frange **blanche** + marge **noire** assez large

mâle généralement **bleu-violet** sur le dessus



courbure prononcée

deux ocelles **décalés vers le centre de l'aile**


Autres papillons des prairies humides

Nacré de la Sanguisorbe (*Brenthis ino*)



© D. Demergès

dessus **fauve orangé** avec
des **macules noires**



© P. Peyrache

5 ocelles

tache violet délavé